

Ganglion stellatum behandeling



Bravis Pijncentrum
Boerhaavelaan 25, 4708 AE Roosendaal
Route 73. Tel.: 088 – 706 85 51
www.bravispijncentrum.nl


Inleiding

Wat is een behandeling van het ganglion stellatum?

Het ganglion stellatum is een zenuwknoop (ganglion) van het onwillekeurig zenuwstelsel.

De zenuwknoop bevindt zich zowel rechts als links van de wervelkolom, aan de voorkant van de wervels ter hoogte van de zesde en zevende halswervel en eerste borstwervel.

De behandeling kan worden uitgevoerd voor pijnklachten in de onderkaak, nek, schouder, borst en arm. De behandeling vermindert ook klachten bij het regionaal pijnsyndroom van de arm, bij sommige stoornissen in de doorbloeding van de arm en bij opvliegers (hot-flushes).



bron: *Regionale Anesthesie, Gustav Fischer Verlag, 1989*

Behandeling

De behandeling gebeurt echogeleid of onder röntgendoorlichting in de pijnbehandelkamer of op de operatiekamer. U wordt gevraagd op uw rug op de behandeltable te gaan liggen. De juiste plaats wordt gemarkeerd en de huid wordt ontsmet. Vervolgens krijgt u een plaatselijke verdoving in de huid.

De anesthesioloog/pijnspecialist zoekt met een speciale naald de zenuwknoop in de hals op. Wanneer de juiste plaats is bepaald, wordt dit gecontroleerd met behulp van een elektrisch stroompje. U kunt een uitstralende druk, tinteling, warmte of pijn in uw arm of pijngebied ervaren.

Afhankelijk van de met u afgesproken behandeling kan het volgende plaatsvinden:

- **Proefinjectie:**
Hierbij wordt verdovingsvloeistof rondom de gevoelszenuwtjes ingespoten. De vloeistof verdooft de zenuwen gedurende enkele uren. Na de behandeling moet u aangeven of uw pijn effectief verminderd of verdwenen is.



- Definitieve blokkade of RF-behandeling:
Wanneer de naalden op de goede plaats staan wordt lokale verdoving ingespoten. Gedurende 1 minuut wordt de naaldpunt opgewarmd. Hierdoor vermindert na verloop van tijd de pijn. Functies als gevoel en spierkracht blijven werken.

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Complicaties

Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.

- Direct na de behandeling kunt u aan de behandelde zijde met één oog wat wazig zien of kan het ooglid afhangen.
- Ook kunt u enkele uren een hese stem hebben. Dit zijn onschuldige bijwerkingen en deze gaan snel over.
- Na de behandeling kan er napijn optreden, die enkele dagen kan aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.
- Een zeer zeldzame complicatie ontstaat wanneer het longvlies wordt aangeprikt, waardoor een klaplong (pneumothorax) kan optreden.

Resultaat

Proefinjectie

Het effect van de verdoving wordt een uur tot enkele dagen na de injectie beoordeeld. Bij een positief resultaat zal met u een definitieve behandeling worden afgesproken.

Bij een negatief resultaat krijgt u een afspraak op de poli om andere behandelmogelijkheden te bespreken.

Definitieve behandeling:

Ongeveer zes tot acht weken na de behandeling is het resultaat pas goed te beoordelen. U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.



Secretariaat Roosendaal

Telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag van 08:00 – 12:30 en van 13:30 tot 16:00 uur op telefoonnummer 088-706 85 51.

Website

Voor meer informatie over ons Pijncentrum kunt u terecht op onze website:
www.bravispijncentrum.nl